

**FACULDADE DE PATOS DE MINAS
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA**

ISABELLA DE MELO VELOSO BENEDITO

**USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS EXODONTIA DE TERCEIROS
MOLARES**

**PATOS DE MINAS
2021**

ISABELLA DE MELO VELOSO BENEDITO

**USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS EXODONTIA DE TERCEIROS
MOLARES**

Artigo apresentado à Faculdade Patos de Minas como requisito parcial para a conclusão do Curso de graduação em Odontologia.

Orientador: Prof. Me. Roberto Wagner Lopes Góes

**PATOS DE MINAS
2021**

FACULDADE PATOS DE MINAS
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

ISABELLA DE MELO VELOSO BENEDITO

**USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS EXODONTIA DE TERCEIROS
MOLARES**

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela banca examinadora do Curso de Bacharelado em Odontologia, composta em 24 de Novembro de 2021:

Orientador: Prof. Me. Roberto Wagnes Lopes Góes
Faculdade Patos de Minas

Examinador 1: Prof. Me. Eduardo Silva Botelho
Faculdade Patos de Minas

Examinadora 2: Profa. Me. Lia Dietrich
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES

USE OF PRF FOR REPAIR OF ALVEOLS AFTER THIRD MOLAR EXODONCY

Isabella de Melo Veloso Benedito¹:

¹ Acadêmica do curso de bacharelado em Odontologia da Faculdade Patos de Minas (FPM), na cidade de Patos de Minas-MG, Brasil. isa_veloso_@hotmail.com

Roberto Wagner Lopes Góes ²:

² Mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Franca – UNIFRAN, Franca-SP, Brasil. roberto.goes@faculdadepatosdeminas.edu.br

Eduardo Silva Botelho ³:

³ Mestre em Endodontia pela São Leopoldo Mandic – Campinas, São Paulo, Brasil. eduardo.botelho@faculdadepatosdeminas.edu.br

Lia Dietrich :

Doutora em Clínica Odontológica pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia-MG, Brasil. lia.dietrich@ufvjm.edu.br

USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES

RESUMO

A Fibrina Rica em Plaquetas (PRF) é um processo autólogo, que consiste na remoção de uma amostra de sangue retirada do paciente, onde a mesma é colocada em um tubo de ensaio, posteriormente sendo centrifugada, e depositada no alvéolo após a extração do terceiro molar. Esta terapia ainda está em avanços, porém que tem sido utilizado cada vez mais nas extrações de terceiros molares, onde auxilia na regeneração óssea e tecidual. O objetivo deste trabalho visa salientar a influência do PRF na regeneração tecidual e óssea, incluindo sua utilização e seus benefícios em alvéolos pós exodontia. A metodologia realizada constituiu em realizar uma revisão narrativa da literatura sendo pesquisadas obras em bases de dados científicos, como: Scielo, PubMed LILACS no período de 1996 a 2020. Assim, a Fibrina Rica em Plaquetas atua como coadjuvante na cicatrização e regeneração óssea e tecidual, e por ser um processo autólogo o riscos de rejeição são mínimos. Conclui-se que, o PRF é um processo que ainda está em avanços, entretanto, é uma ótima alternativa para regeneração de alvéolos pós extrações de terceiros molares, por ter propriedades biológicas únicas.

Descritores: Fibrina. Regeneração óssea. PRF.

ABSTRACT

Fibrin Rica em Plaquetas (PRF) is an autologous process, which consists in the removal of a blood sample taken from the patient, where it is placed in a test tube, later centrifuged, and deposited in the alveole after extraction of the third molar. This therapy is still in advances, but it has been used more and more in the extractions of third molars, where it helps in bone and tissue regeneration. The objective of this work is to highlight the influence of PRF on tissue and bone regeneration, including its use and its benefits in alveolos after exodontia. The methodology was to perform a narrative review of the literature and researched works in scientific databases, such as: Scielo, PubMed and LILACS in the period from 1996 a 2020. Thus, Fibrina Rica em Plaquetas acts as an adjunct in bone and tissue healing and regeneration, and because it is an autologous process the risks of rejection are minimal. It is concluded that the PRF is a process that is still in progress, however, it is a great alternative for the regeneration of alveolos after extractions of third molars, because it has unique biological properties.

Keywords: Fibrina; Bone regeneration; PRF.

INTRODUÇÃO

Os terceiros molares são os últimos dentes a erupcionarem na cavidade oral, com isso possuem uma maior chance de ausência de espaço na arcada dentária. Por esta razão são chamados também de dentes inclusos ou impactados. Esses dentes tornam-se impactados devido ao fato de o arco ósseo alveolar ser menor que o comprimento da arcada dentária (1).

Em sua maioria, os dentes impactados são quase sempre indicados para extração. No entanto, o pós-operatório desse tipo de extração, vem com um leque de preocupações e também de possíveis complicações, com isso o paciente tem o risco de infecções, dor, edema, osteíte alveolar, lesões nervosas a possíveis fraturas de mandíbula (1,2)

Diante disso, a busca por formas de minimizar os efeitos negativos das extrações de terceiros molares, recomendou-se o uso de concentrados plaquetários só que de forma autóloga, ou seja, utiliza-se o sangue do próprio paciente, para auxiliar no processo de regeneração do local, seja em casos cirúrgicos ou em feridas (3).

Por ser um processo totalmente “natural”, as Fibrinas Ricas em Plaquetas (PRF) possui propriedades benéficas para a cicatrização tecidual e regeneração óssea. Pode-se dizer que o PRF tem um “poder” curativo, principalmente em regiões de tecido mole ao redor de incisões e de onde foi causada a ferida. São encontradas também citocinas plaquetárias, que são liberadas de acordo com que a fibrina é absorvida pelo organismo. Essas citocinas juntamente com os leucócitos, desempenham um papel de grande importância para evitar os processos infecciosos e inflamatórios (3).

O objetivo desse trabalho é mostrar a influência do PRF na regeneração tecidual e óssea, incluindo sua utilização e seus benefícios em alvéolos pós exodontia.

METODOLOGIA

Para este trabalho, utilizou-se a revisão narrativa da literatura nas bases de dados científicas como: Scielo, PubMed LILACS. Foi realizada a busca através das palavras-chave: fibrina; regeneração óssea; PRF. Foram consultadas base de dados publicados entre o período de 1996 a 2020.

REVISÃO

1. Processo fisiológico do reparo alveolar pós exodontia

Após a realização de uma exodontia, ocorre uma cascata de acontecimentos fisiológicos para reparo morfológico e funcional, tanto ósseo quanto tecidual. Imediatamente após a extração dentária, é formado um coágulo sanguíneo dentro do alvéolo, que gradativamente vai sendo invadido por fibroblastos que normalmente

são originados da diferenciação de células mesenquimais ou pela mitose de outros fibroblastos já existentes, que se encontram no ligamento periodontal que está preso as paredes alveolares (4,5).

Posteriormente, ocorre a amplificação de tecido conjuntivo que é constituído principalmente por fibroblastos que darão origem as fibras colágenas. A medida que essas fibras colágenas se proliferam, há um diminuição de células e de vasos sanguíneos, com isso dando início a fase de maturação do tecido conjuntivo (4).

Na parte inferior do alvéolo e das paredes alveolares se encontram os osteoblastos, que são responsáveis pela formação de matriz orgânica, através dessa matriz orgânica que são constituídas as trabéculas ósseas (4).

As trabéculas ósseas espessas e com canais medulares bem pronunciados, são encontradas dentro do alvéolo quando todo o processo de reparo ósseo e tecidual já está totalmente concluído (4).

Clark define o processo de cicatrização em três fases, que são divididas em: fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e fase de maturação (6).

Fase inflamatória

Inicia-se após uma lesão, nesta fase acontece o transporte de tromboxana A2 e de prostaglandinas através das membranas celulares, que são vasoconstritoras. O processo de coagulação é excitado pelo endotélio lesionado e também pelas plaquetas que são responsáveis pelo processo de reparação tecidual. Em busca da homeostase, as plaquetas liberam grânulos, que são micropartículas, que possuem fatores de crescimento e que induzem os neutrófilos até a o local lesionado (8).

Após 24 horas da lesão, os neutrófilos já estarão em um agrupamento maior ocupando quase totalmente a ferida, diante disso, eles irão concentrar-se nas paredes do endotélio através das ligações com receptores da membrana, produzindo radicais livres, que causam a lise bacteriana e aos poucos são trocados pelos macrófagos (7,8).

Os macrófagos demoram em média de 48 a 96 horas até que se deslocam totalmente para a lesão, sendo responsáveis pela replicação celular e também pela remoção do tecido necrosado, processo pelo qual é iniciado através dos neurófilos. Outra função pertinente dos macrófagos, é secretar citocinas e os fatores de crescimento, que auxiliam na angiogênese, no processo de fibroplasia, que visa a produção de colágeno através dos fibroblastos, e pôr fim a produção de matriz extracelular, processos esses indispensáveis para a fase proliferativa (7,8).

Fase proliferativa

Nesse estágio, acontece um processo conhecido como fibroplasia, que é originado da multiplicação dos fibroblastos, sendo que o processo de fibroplasia ocorre através da atuação conjunta das citocinas. Posteriormente, as células endoteliais presentes nos fibroblastos se proliferam, formando uma volumosa rede de vascularização e também há uma formação volumosa de macrófagos, que darão origem aos tecidos de granulação (8).

Nessa fase proliferativa, há uma subdivisão importante, são elas, neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização (8):

Na neo-angiogênese, ocorre a proliferação de novos vasos sanguíneos (angiogênese) para manter a hemostasia no processo de cicatrização da ferida. Basicamente, nesse processo acontece a nutrição dos tecidos do local da ferida, e o aumento da proliferação de células, como os macrófagos e fibroblastos (8,9).

No processo de fibroplasia, os fibroblastos são direcionados para a região inflamatória, se subdividem para produzir matriz extracelular. Os leucócitos fazem todo o trabalho de desinfecção, então somente depois de três dias da lesão que os fibroblastos irão se manifestar (8,9).

O colágeno é produzido através dos fibroblastos, que é uma de suas funções principais, que já começam na fase inflamatória da lesão. Esse colágeno é responsável pela estruturação e pela fortificação da cicatriz (8,9).

E por fim o processo de epitelização, nessa etapa após 24 a 36 horas da lesão, ocorre a proliferação de células epiteliais, através do crescimento epidérmico (9).

Os queratinócitos são as principais células alvas dos traumas, são os que mais sofrem com qualquer tipo de alteração causada na pele. E também o responsável pela síntese de queratina. Após a migração dos queratinócitos da camada basal para a camada epitelial forma-se uma densa camada celular, que auxiliará na estruturação e fortificação do epitélio (8).

Os queratinócitos contidos na pele, produzem a proliferação citocinas, que auxiliará na cicatrização das feridas da pele ou da região lesada (8).

Fase de maturação

O processo de maturação começa na terceira semana após a lesão, e nisso ocorre a ampliação da força, porém sem adição de colágeno. As fibras de colágeno sofrerá apoptose através da colagenase. Essas modificações acarretam na

restauração de uma nova matriz extracelular, processo esse responsável na cicatrização tecidual. A colagenase sintetizada através dos fibroblastos e por leucócitos faz com que haja a morte da matriz antiga. Após a estabilização entre renascimento e morte da matriz, ocorre então a conclusão desse processo de cicatrização (8).

2. A evolução dos concentrados plaquetários

Os hemoderivados são produtos sintetizados em escala industrial, através da divisão do plasma por processos físico-químicos (10). A utilização de hemoderivados começou no final dos anos 70 na Europa, usavam-se as colas de fibrinas, com a intenção de reparo das feridas, promovendo a hemostasia da lesão, mesmo havendo deficiência de coagulação (11).

Independentes dos bons resultados das colas de fibrinas foram proibidas a sua comercialização em 1978 nos Estados Unidos, pelo fato de promover infecções cruzadas (11).

Através da proibição da utilização de colas de fibrinas, começou-se a desenvolver novos tipos de hemoderivados, com base nos fatores de crescimento contidos nas plaquetas, com isso, dando vida aos concentrados plaquetários (11).

Plasma rico em plaquetas

O plasma rico em plaquetas (PRP) é composto basicamente de plaquetas, fatores de crescimento, leucócitos, entre outras células contidas no plasma. O PRP tem como objeto principal o reparo tecidual (11).

O PRP é obtido através da remoção de sangue do paciente, que é colocado em um frasco contendo citrato de sódio como anticoagulante. Esse coagulante é o mais recomendado devido as suas propriedades de ligação com íons de cálcio dando origem aos quelatos, que impede a coagulação precoce do plasma, em seguida, para obtenção do gel de plaquetas, coloca-se cloreto de cálcio, que o coágulo se formará de forma espontânea, posteriormente centrifugada (12).

Para a produção de PRP, a centrifugação é essencial, a amostra pode ser centrifugada em uma etapa ou em duas. No processo de uma etapa, a amostra depois de centrifugada apresentará na parte do final do tudo as hemácias por ter maior peso, os leucócitos se localizam na parte central, e o plasma na parte superior. As plaquetas juntamente com os leucócitos, formam uma camada esbranquiçada, conhecida de zona névoa (12).

No processo feito em duas etapas, depois da centrifugação, as hemácias são retiradas e o plasma volta para a centrífuga, levando em consideração a queda das plaquetas e das poucas hemácias que possam estar presentes no tubo. Em seguida, 80% da parte superior do plasma, representa o plasma pobre em plaquetas (PPP), que é posteriormente descartado. Na parte inferior do tubo, encontra-se um botão plaquetário, que será recolocado com o plasma, dando origem ao PRP (12).

Além do reparo tecidual, o PRP tem auxiliado na hemostasia da lesão e também estimulando a angiogênese, com isso diminuindo as complicações pós-operatórias, potencializa o processo de cicatrização e diminui no tempo de recuperação do paciente (12).

Fibrinas ricas em plaquetas

As fibrinas ricas em plaquetas (PRF) são obtidas da mesma forma que o PRP, que é através do sangue do próprio paciente, porém sem uso de anticoagulantes ou de trombinas (11).

Após a retirada de uma amostra de sangue, a mesma é colocada em um tubo de ensaio de 10 ml, onde é depositada em uma centrífuga que fará um movimento de rotação a 3000 rpm, por até 10 minutos, e sem qualquer adição de anticoagulantes. Logo após centrifugada a amostra, apresentará na forma de um coágulo, ou seja, aquele sangue que foi depositado no tubo, ficará dividido em três partes, sendo que na parte central do tubo terá um coágulo de fibrina, na parte inferior concentra-se os glóbulos vermelhos e na parte superior plasma acelular (12).

Para se obter essa fibrina de forma adequada para utilização, depende inteiramente do sucesso da técnica usada pelo profissional na retirada do sangue do paciente. É necessária que esta amostra seja coletada o mais rápido possível e imediatamente colocada na centrífuga (12).

Em casos de demora para esse processo, o sangue que está no tubo de ensaio em contato com o vidro, por ser um fator fisiológico do sangue, começará a coagular, e quando entrar em centrifugação produzirá menos coágulos sanguíneos, perdendo a consistência ideal para utilização, com isso inutilizando a amostra coletada (13).

Por ser um processo totalmente “natural”, o PRF possui propriedades benéficas para a cicatrização tecidual e regeneração óssea (13).

Pode-se dizer que o PRF tem um “poder” curativo, principalmente em regiões de tecido mole ao redor de incisões e de onde foi causada a ferida. São encontradas

também citocinas plaquetárias, que são liberadas de acordo com que a fibrina é absorvida pelo organismo. Essas citocinas juntamente com os leucócitos, desempenham um papel de grande importância para evitar processos infecciosos e inflamatórios (13).

3. Fibrinas ricas em plaquetas no reparo alveolar pós exodontias

Com o uso do PRF nos alvéolos pós extrações, o processo de cicatrização é acelerado pelo fato de que há uma liberação contínua de fatores de crescimento (13). O PRF reduz também os riscos de uma extração de terceiros molares, como o trismo, osteíte alveolar, edema, infecções (11).

Outras formas de reparação tecidual e óssea com o uso do PRF, é a combinação com enxertos alógenos, tem tido grande significância no ganho de volume ósseo, por conduzir a liberação de fibroblastos e de osteoblastos, promove a reepitelização da região lesada devido ao aceleração da cicatrização (13).

DISCUSSÃO

Dentre os concentrados plaquetários, o PRF mostra-se superior tanto para sua obtenção, que é feita de forma simples através do sangue do próprio paciente, o custo é relativamente baixo para ser preparado, e demonstra ser bastante eficaz. Outro ponto que deve ser considerado é o fato de que, para a preparação do PRF não é necessário o uso de coagulantes. Já o PRP, é necessário o uso de trombinas bovinas e cloreto de cálcio no processo de coagulação, o que de certo modo, o torna mais complexo. Por este acréscimo de coagulantes, a membrana começa o processo de coagulação de forma não homogênea podendo gerar resultados diferentes dependendo da forma de produção (12,14). Entende-se que o PRF em relação ao PRP, mostra-se mais eficaz devido as suas propriedades totalmente biológicas, levando também em consideração o custo para a obtenção de ambos, o PRF depende apenas do sangue do paciente, sem uso de aditivos. Em contrapartida, o PRP exige o uso de trombinas bovinas e cloreto de cálcio, que o faz ter um valor mais elevado, não sendo tão acessível aos pacientes como o PRF. Após a realização de uma exodontia, ocorrem diversos processos fisiológicos para reparar o local lesionado. São formados coágulos sanguíneos, que posteriormente serão tomados por fibroblastos que darão origem as fibras colágenas. No interior do alvéolo e das paredes alveolares se encontram os osteoblastos, que são responsáveis pela formação de matriz orgânica, que são constituídas as trabéculas

ósseas. As trabéculas ósseas espessas e com canais medulares bem pronunciados, são encontradas dentro do alvéolo quando todo o processo de reparo ósseo e tecidual já está totalmente concluído (15,16). Após ser inserido no local de ação, o PRF libera gradativamente fatores de crescimento, promovendo a proliferação de fibroblastos e osteoblastos, e também o processo de angiogênese, que consiste na formação de vasos sanguíneos originados de outros. Outro papel importante do PRF é a regulação da imunidade. As citocinas presentes no PRF são importantes na homeostase tecidual, sendo responsáveis por gerar o mecanismo de defesa (13,17). É fato que, para que ocorra o processo de cicatrização é necessário que haja uma cascata de fatores que levará a reparação óssea e tecidual. Com o uso do PRF, todo esse processo é acelerado devido a constante liberação de fatores de crescimento no local.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, o uso do PRF em consultório odontológico é um processo relativamente novo, que está em processo de estudo, entretanto, a utilização das fibrinas em extrações de terceiros molares impactados, tem sido bastante promissor na recuperação do pós operatório dos pacientes submetidos a extrações mais complexas.

Diante dos diversos concentrados plaquetários, o que mais se assemelha ao processo de coagulação fisiológica é o PRF, por ser obtido através do sangue do próprio paciente, logo, possui menos chances de possíveis rejeições.

Outro ponto positivo do PRF se deve ao fato de acelerar o processo de reparação tecidual e a regeneração óssea. É importante que o cirurgião dentista esteja apto para executar o procedimento.

REFERÊNCIAS

1. Vasconcellos RJH, Oliveira DM, Melo-Luiz AC, Gonçalves RB. Ocorrência de dentes impactados. Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac [periódico na Internet]. 2003 jan/mar. [acesso em 20 out 2021] Disponível em: <http://www.revistacirurgiabmf.com/2003/v3n1/pdf/artigo06.pdf>
2. Antunes HDA. Complicações associadas à extração de terceiros molares inclusos.] Universidade Fernando Pessoa Faculdade Ciências Da Saúde.

- [periódico na internet] 2014. [acesso em 20 out 2021] Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4465/1/PPG_11784.pdf
3. Cardoso BL. A utilização do I-prf no controle pós operatório após exodontia de terceiros molares. Unisul. [periódico na internet] 2018. [acesso em 09 jul 2021] Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/9991/1/tcc%20BR ENO%20versao%20revisao%20de%20literatura.pdf>
 4. Veronese RM, Milanezi LA, Okamoto R, Okamoto T. Processo de reparo em feridas de extração dental. Interferência da solução anestésica contendo articaína 4% + adrenalina 1:100.000: análise histológica em ratos. [periódico na internet] Rev. Odontol. de Araçatuba. p. 65-72, Janeiro/Junho, 2005.[acesso em 01 jul 2021] Disponível em: <https://apcdaracatuba.com.br/revista/v26n1/pdf/processodereparo.pdf>
 5. Montero-Sánchez I, Cabrera-Peralta C, Okamoto T. Influência da desnervação regional no processo de reparo alveolar. Estudo histológico em ratos. [periódico na internet] Rev. Odontol. UNESP. 25(2): 327-344, 1996. [acesso em 1º jul 2021] Disponível em: <https://www.revodontolunesp.com.br/article/5880177c7f8c9d0a098b4759/pdf/rou-25-2-327.pdf>
 6. Campos ACL, Broges-Branco A, Groth AK. Cicatrização de feridas. [periódico na internet] ABCD Arq Bras Cir Dig 2007;20(1):51-8. UFP. 2007. [acesso em 01 jul 2021] Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/wzTtGHxMQ7qvkBbqDLkTF9P/?format=pdf&lang=pt>.
 7. Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 488. 2004. [acesso em 01 jul 2021]
 8. Pimenta IP, Oliveira NMM, Gomes ACP. Processo de reparo tecidual do alvéolo dental - Uso da Boneheal para regeneração óssea guiada (rog). UNIFRAN. [periódico na internet] 2015 [acesso em 01 jul 2021] Disponível em: <https://boneheal.com.br/downloads/MONOGRAFIAUsodeBoneHealnaROG-Unifran-Revisao-de-Literatura.pdf>
 9. Tazima MFGS, Vicente YAMVA, Moriya T. Biologia da ferida e cicatrização. Medicina. [periódico na internet] 2008.[acesso em 01 jul 2021] Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/271/272>
 10. Razouk FH, Reiche EMV. Caracterização, produção e indicação clínica dos principais hemocomponentes. Rev Bras Hematologia e Hemoterapia. [periódico na internet] 2004 [acesso em 09 Jul 2021] Volume 26, número 2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbhh/a/FrGr84KqGzB9kZVrpbGPQTL/?lang=pt>

11. Giongo TS. Efeitos clínicos do l-prf após exodontia de terceiros molares: revisão de literatura. Unisul. [periódico na internet] 2017. [acesso em 09 jul 2021] Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/9993/1/TCC%20odontologia%20Talita%20Rosa%20Giongo.pdf>
12. Aleixo GAS, Coelho MCOC, Trajano SC, Andrade LSS. Plasma rico em plaquetas: mecanismo de ação, produção e indicações de uso - Revisão de literatura. Ufrpe. [periódico na internet] 2018. [acesso em 09 jul 2021] Disponível em: <http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria/article/view/1953/482482571>
13. Hak S. L-prf – Aplicação clínica em implantodontia. Unifacvest. [periódico na internet] 2020 [acesso em 09 jul 2021] Disponível em: https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/6dd19-hak,-s.-l-prf---aplicacao-clinica-em-implantodontia.-odontologia.-lages -unifacvest,-2020-01_.pdf
14. Cardoso ML, Lopes SM. Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (l-prf). Diminuindo a morbidade em procedimentos de reconstruções teciduais orais. [periódico na internet] UFF, 2015. [acesso em 20 out 2021] Disponível em: http://www.punf.uff.br/arquivos_punf/tcc/odontologia/2015/1/fibrinamicaemplaquetaseleucocitoslprfdiminuindoamorbidadeem.pdf
15. Hupp, James R, Ellis, Edward, DDS, Tucker, Myron R. (Ed.). Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, xiv, 704 p. pp. 129-299, 2009. [acesso em 01 jul 2021]
16. Silva RA, Zambuzzi, FW, et.at. Queratinócitos e seus desafios: uma revisão da literatura sobre mecanismos intracelulares. Saúde REV. [periódico na internet] 2013 [acesso em 09 jul 2021] v. 13, n. 35, p. 3-14, set.-dez Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279440534_Queratinocitos_e_seus_desafios_uma_revisao_da_literatura_sobre_mecanismos_intracelulares
17. Favero HRZ. Revisão comparativa entre agregados plaquetários e sangue total relacionados com osseointegração e titânio. Ufsc, [periódico na internet] 2018. [acesso em 09 jul 2021] Disponível em: <http://docplayer.com.br/71010516-Trabalho-de-conclusao-de-curso.html>
18. Rodrigues G, et al. Fibrinas ricas em plaquetas, uma alternativa para regeneração tecidual: revisão de literatura. J Oral Invest. [periódico na internet] 2015 [acesso em 09 jul 2021] 4(2): 57-62, 2015 - ISSN 2238-510X. Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/JOI/article/view/1526/898>

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus que até aqui tem nos sustentado, e nos dado forças para seguir em frente, enfrentando todos os obstáculos passados durante esses cinco anos de curso.

Agradeço a minha família que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me incentivando em minhas escolhas.

Meus agradecimentos a todo corpo docente da Faculdade Patos de Minas, por todo conhecimento transmitido a nós.

Em especial meu orientador Roberto Wagner Lopes Goes e a professora impecável, Lia Dietrich, agradeço por todo cuidado e paciência durante todo processo.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Patos de Minas, 23 de Novembro de 2021.

Isabella de Melo Veloso Benedito

Roberto Wagner Lopes Goés

**DECLARAÇÃO DAS DEVIDAS MODIFICAÇÕES EXPOSTAS EM DEFESA
PÚBLICA**

Eu _____,
matriculado sob o número _____ da FPM, DECLARO que efetuei
as correções propostas pelos membros da Banca Examinadora de Defesa Pública
do meu TCC intitulado: **USO DE PRF PARA REPARO DE ALVÉOLOS PÓS
EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES**

E ainda, declaro que o TCC contém os elementos obrigatórios exigidos
nas Normas de Elaboração de TCC e também que foi realizada a revisão gramatical
exigida no Curso de Graduação em
_____ da Faculdade Patos de Minas.

Assinatura do Aluno Orientando
Graduando Concluinte do Curso

DECLARO, na qualidade de Orientador(a) que o presente trabalho está
AUTORIZADO a ser entregue na Biblioteca, como versão final.

Nome
Professor(a) Orientador(a)

